Gentile Collega,

il documento intrasocietario intitolato “Recomandations for harmonization of the coagulation screening tests in laboratory report” (Biochimica Clinica2023, vol 47, n 4)., dopo puntuale presentazione delle motivazioni a supporto, raccomanda specifiche modalità di refertazione. Per il tempo di Protrombina (PT) viene indicato l’utilizzo di *Ratio* e di *INR* (a fronte di indicazioni circa la terapia del paziente) e per il Tempo di tromboplastina parziale attivata (aPTT) l’utilizzo di *Ratio*.

In qualità di provider VEQ pubblico regionale, abbiamo ritenuto di partecipare alla diffusione del documento tramite il nostro sito web.

Come già saprai la maschera di inserimento dei risultati VEQ, prevede la possibilità di attivare o disattivare le varie modalità di espressione del dato analitico, con un flag da apporre nell’apposito spazio. Tramite questa funzione, puoi selezionare la modalità di refertazione che ritieni appropriata, sia in base al dato analitico ma anche in base alla Tua pratica corrente. Per questo motivo riteniamo di non dover obbligare il partecipante agli esercizi VEQ Coagulazione I, ad utilizzare esclusivamente le modalità di refertazione suggerite dal documento indicato, ma di agire in modo analogo alla gestione del campione biologico di un paziente.

Questo consentirà al provider di fotografare la realtà operativa e di restituire quindi, a tutti gli stakeholders, un’immagine non condizionata da scelte a priori.